


Jede Verletzung erfordert sofortiges Handeln!



**Nadelstich
Schnittwunde
Biss/Kratzer**



- 1) **Blutung anregen (ca. 2-3 min.),** um möglichst alles Fremdmaterial aus der Wunde zu entfernen.
- 2) **Intensive Desinfektion (2-3 min. - besser 10 min.).**
- 3) **Kontaminierte Schleimhäute** z. B. Mund intensiv mit Schleimhautantiseptikum, Augen mit Wasser oder Kochsalzlösung ausspülen (Augenspülflasche verwenden).
- 4) Umgehendes Aufsuchen der **AUFNAHME/Kinder (Leitstelle) oder AMBULANZ/Frauen** um sofortige Maßnahmen einzuleiten.

Eine eventuelle Medikamenteneinnahme sollte so rasch als möglich, spätestens 72 Stunden nach der Verletzung verabreicht werden.

Zuständig: **der/die diensthabende OBERARZT/ÄRZTIN**

- 5) Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist eine **Unfallmeldung innerhalb von 5 Tagen in der Personalstelle** erforderlich!

Vermeiden Sie Verletzungen!

- ◆ Ungeordnete Arbeitsweise erhöht die Unfallgefahr!
- ◆ Tragen Sie deshalb bitte unbedingt **Handschuhe** beim Umgang mit Körperflüssigkeiten, bei Spritzgefahr auch Mund- und Augenschutz! (Handschuhe schützen nicht vor Stich- und Schnittverletzungen, helfen aber die in den Körper eingebrachte Menge an Blut zu reduzieren!)
- ◆ Stecken Sie **NIE gebrauchte Kanülen in die Schutzhülle zurück!**
- ◆ **ENTSORGEN** Sie diese Gegenstände **SOFORT** in hierfür bereitstehende, durchstichsichere **Abwurfbehälter!** Diese gelben Sammelboxen sollten **nur zu ¾ befüllt** werden (Gefahr von herausragenden spitzen Gegenständen).

Nutzen Sie die angebotenen Impfungen gegen Hepatitis B und Diphtherie-Tetanus.